




社交溝通障礙



社交溝通障礙是一種社交上執行功能障礙，是指患者未能有效地接收有關社交場合的訊息，繼而作出適當的回應。他們在考慮對方立場、想法、已有知識、意圖及感受上更有明顯困難，故此經常做出一些令人厭惡，甚至令人難以接受的行為。他們較難與人建立關係，且往往被孤立。

常見的社交溝通障礙特徵

- 不懂得建立或加入話題
- 不懂得如何延續話題
- 大部分的談話內容都圍繞他們自己的喜好
- 以為別人的想法跟自己一樣，不明白別人的觀點與角度。
- 不能解讀別人的身體語言，如表情及身體動作。未能從這些訊息了解別人的動機、情緒及想法，因而未能調整自己給予恰當的反應。

在患有社交溝通障礙的人士中，自閉症及亞氏保加患者是較常見的一群。但除此以外，在學校或工作團體中，會有一些人際關係較差但未有確診為自閉症或亞氏保加症的人士；他們可能有社交溝通障礙。

近年言語治療師多舉辦了社交思考課程。訓練概念建基於ILAUGH社交思考模式(一位美國資深言語治療師MICHELLE G. WINNIE所發展的一套社交思考模式。基礎概念包括：

- I = INITIATION OF LANGUAGE (啟動語言)
- L = LISTENING WITH EYES AND BRAIN (用眼睛和腦袋聆聽)
- A = ABSTRACT AND INFERENTIAL LANGUAGE/COMMUNICATION (推斷別人說話的意思)
- U = UNDERSTANDING PERSPECTIVE (明白別人的角度和立場)
- G = GESTALT PROCESSING/GETTING THE BIG PICTURE (完整的分析)
- H = HUMOR AND HUMAN RELATEDNESS (幽默感與人際關係)

如任何人士需要社交思考能力的訓練，可向任何言語治療師或香港中文大學人類傳意科學研究所查詢。📞